

解答例

1

① 練習問題

頸椎損傷による左TyII上腕から手背部までの痺れとTyIII肩甲部から前腕までの痺れ

- 処方
- (1) lAyIII/a
 - (2) lAyII/a
 - (3) lTyII/a/6+3+c
 - (4) lTyIII/a+bc/bc+6+3

2

② 練習問題

頸椎損傷後、右上腕から指まで尺側の痺れ (TyIII・TxIII)

- 処方
- (1) rAyIII/a
 - (2) rAyII/a
 - (3) rTyII/a
 - (4) rTyIII/a+d/6+3+c+d
 - (5) rTxIII/a+d/6+3+c+d

3

③ 練習問題

腰椎損傷による左腰～坐骨部(AyIII・AyII)の痛みと、左大腿部から第3・4趾(AyII)および下腿前側(AyI)までの痺れ

- 処方
- (1) lAyIII/4+b
 - (2) lAyII/4+b+d/6+3+c+d
 - (3) lAyI/a/6+3

4

④ 練習問題

腰椎損傷による右腰(L4/5)の痛みと、右大腿外側から下腿外側、足背部(AyII)と下腿内側(AxII)の痺れ

- 処方
- (1) rAyIII/4
 - (2) rAyII/4/6+3+c
 - (3) rAxII/a/6+3

5

⑤ 練習問題

腰椎損傷による右腰の痛み(AyIII)と、右大腿から下腿外側(AyII)および後面(AyIII)の痺れ

- 処方
- (1) rAyIII/4+b/6+3
 - (2) rAyII/4/6+3
 - (3) rAyI/a

6

⑥ 練習問題

頸椎損傷後、左TxI、TxIIIの痺れとTyI、TyIIIの重み

- 処方 逆
- (1) lAyIII/a
 - (2) lTyI/a
 - (3) lTyIII/a

7

⑦ 練習問題

頸椎損傷後、左TxIIの痺れとTyIIの重だるさ

- 処方 逆
- (1) lAyIII/a
 - (2) lTyI/a
 - (3) lTyIII/a
 - (4) lTyII/a
 - (5) lTxI/a
 - (6) lTxIII/a

8

⑧ 練習問題

頸椎損傷後、右手～指に陽経全体の重みと陰経全体の痺れ

- 処方 逆
- (1) rAyIII/a
 - (2) rTyI/a
 - (3) rTyIII/a
 - (4) rTyII/a

9

⑨ 練習問題

頸椎損傷後、右拇指・小指握力低下、右TyII前腕～第3指までの重だるさと痺れ、右TxII手首から指の痺れ

- 処方
- | 逆 | 順 |
|--------------|-----------------------|
| (1) rAyIII/a | (7) rAyII/a |
| (2) rTyI/a | (8) rTyII/a+d/6+3+c+d |
| (3) rTyIII/a | |
| (4) rTyII/a | |
| (5) rTxI/a | |
| (6) rTxIII/a | |

10